

ВНИМАНИЕ!**ЗООАНТРОПОНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

Это инфекционные заболевания общие для человека и животных.

Основными источниками инфекций являются: дикие и синантропные грызуны, дикие (лисицы, волки, кабаны, лоси, косули) и домашние (коровы, овцы, козы, собаки, лошади, свиньи, кошки) животные.

Иерсиниоз – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется многообразием клинических проявлений, частым рецидивирующим и затяжным течением, общей интоксикацией организма, сыпью, поражением желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, печени и других органов.

Заражение происходит:

- при употреблении в пищу в сыром виде, либо без предварительной или при недостаточной термической обработке инфицированных выделениями грызунов овощей и фруктов, корнеплодов, а также мясных продуктов и птицы, молока и молочных продуктов, приготовленных с нарушением температурного режима или вторично обсемененных готовых блюд;
- при употреблении воды из открытых водоёмов;
- при контакте с больными животными.

Бруцеллёз – инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, характеризуется поражением сосудистой, нервной и других систем организма человека, особенно опорно-двигательного аппарата.

Заражение происходит:

- при употреблении некипячёного молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.), мяса и мясных продуктов;
- при попадании в организм человека вместе с вдыхаемым воздухом и пылью, содержащими заражённые частицы шерсти, навоза, почвы;
- при разделке туш больного животного.

Лептоспироз – инфекционное заболевание, поражающее печень, почки, сердечно-сосудистую и нервную системы и протекающее с выраженным синдромом общей интоксикации и развитием геморрагического синдрома.

Заражение происходит:

- через инфицированные выделениями грызунов предметы быта, пищевые продукты;
- через воду водоёмов при купании, рыбной ловле;
- при употреблении в пищу некипячёной воды из колодцев и открытых водоёмов;
- при уходе за домашними животными, при убое и разделке туш животных;
- при уборке подсобных помещений.

Листерия – инфекционное заболевание человека и животных, характеризующееся поражением защитных клеток иммунной системы с развитием многочисленных симптомов. Особенно опасно для беременных, людей старше 65 лет и лиц с ослабленной иммунной системой.

Заражение происходит:

- при употреблении мяса, молока, сыра, яиц от больной птицы (животного), овощей, салатов, воды заражённых выделениями больных грызунов;
- при контакте с заражёнными животными или продуктами их жизнедеятельности;
- при укусе клещами, блохами, паразитирующими на больном животном;
- внутриутробно от матери к ребёнку.

**Основные меры профилактики:**

- приобретать продукты в строго установленных местах;
- хранить пищевые продукты и питьевую воду в местах, недоступных для грызунов;
- тщательно мыть свежие фрукты, зелень и овощи;
- хранить продукты только в течение рекомендованного срока годности с соблюдением температурного режима;
- соблюдать технологию приготовления блюд из мяса, птицы и других продуктов животного происхождения, подвергая достаточной термической обработке;
- не употреблять воду из природных и искусственных водоёмов (использовать качественную питьевую воду);
- соблюдать правила личной гигиены (в т.ч. при контакте с любым животным);
- обеспечить защиту жилья и построек от проникновения грызунов, проводить профилактические дератизационные мероприятия;
- не допускать употребление сырого молока, приобретённого у частных лиц.

Лицам, содержащим скот в частных подворьях:

- проводить регистрацию животных в ветеринарном учреждении;
- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения проводить только с разрешения ветеринарной службы;
- информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания домашних животных, в том числе аборты, рождение нежизнеспособного молодняка;
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.